

ま おう とう  
サンワ 麻 黄 湯 エキス細粒「分包」

サンワ麻黄湯エキス細粒「分包」は、漢方処方「麻黄湯」の水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと  
体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
2. 短期間の服用にとどめ、連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 胃腸の弱い人。
  - (4) 発汗傾向の著しい人。
  - (5) 高齢者。
  - (6) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - (7) 次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難
  - (8) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感
そ の 他	発汗過多、全身脱力感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感 やこわばりに加えて、脱力感、筋肉 痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位（感冒、鼻かぜに服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	1 包
7才～14才	2/3 包
4才～6才	1/2 包
4才未満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成 分

本品1日量 …… 3包（1包 2g）中  
麻黄湯エキス …… 1.4g

マ オ ウ ……	5.0g
キ ョ ウ ニ ン ……	5.0g
ケ イ ヒ ……	4.0g
カンゾウ ……	1.5g
＊上記の生薬より抽出したエキス	

添加物として乳糖、トウモロコシデンプンを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- ＊(4) 1包を分割した残りを服用する場合には袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室  
東京都千代田区外神田 6-6-1  
T E L 03-3834-2171（代）  
（月～金曜日 10：00～17：00 但し祝日を除く）



三 和 生 薬 株 式 会 社  
栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1

適応症

体力充実して、かぜのひきはじめて、さむけがして発熱、頭痛があり、せきが出て身体のふしぶしが痛く汗が出ていないものの次の諸症：  
感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。

Please be sure to read this leaflet before taking this medicine.  
Please keep this leaflet to read anytime.

Item Number 142

Revised : April 2018

Category 2 OTC medicines

## SANWA *Maoto* Extract Fine Granules [packets]

This product is easy to take, fine granules packets made from the extract of Kampo preparations (Japanese traditional herbal medicines) called “maoto”.

### CAUTION FOR USE

#### To be avoided

Failure to observe the following may result in the symptoms worsening or the occurrence of adverse reactions/accidents.

1. Following persons should not take this medicine:

Persons who is physically weak (declining of strength or constitutional weakness).

2. Take this medicine only for a short period. Do not take it continuously.

#### Who should seek consultation

1. The following persons should consult a physician, pharmacist, or registered distributor before taking this medicine.

- (1) Persons undergoing medical treatment from a physician.
- (2) Pregnant women or women suspected of being pregnant.
- (3) Persons who have gastrointestinal weakness.
- (4) Persons with excessive sweating.
- (5) Elderly persons.
- (6) Persons who have experienced rash, redness, itching, etc. due to medicines or something.
- (7) Persons with the following symptoms: edema, difficulty in urination.
- (8) Persons diagnosed as having the following: hypertension, heart disease, kidney disease, thyroid disease.

2. The following symptoms may be adverse reactions to this medication. If any of these symptoms occur, stop taking this medicine immediately and consult a physician, pharmacist, or registered distributor. Take the instruction leaflet with you.

Related areas	Symptoms
Skin	Rash, redness, itching
Gastrointestinal system	Nausea, loss of appetite, gastric distress
Others	Excessive sweating, general listlessness

In very rare cases the following serious symptoms may occur. In this case, consult a physician immediately.

Symptoms' name	Symptoms
Pseudoaldosteronism, myopathy	In addition to listlessness, stretched feeling, and stiffness of hands and feet, feeling of weakness and muscular pain will appear and gradually worsen.

3. Stop taking this medicine and consult a physician, pharmacist or registered distributor if symptoms do not improve after taking this medicine for about 1 month (5 to 6 times if you take this medicine for the common cold and coryza). Take this leaflet with you.

### INDICATIONS

Following symptoms in the initial stage of common cold in persons with substantial physical strength who have chilling with fever, headache and coughing, and suffered from pain in joints and muscles without sweating:

Common cold, coryza, bronchitis, and stuffy nose.

### DOSAGE

Take the following dosages 3 times a day before or between meals.

Age	One dosage
Adult(15 years and over)	1 packet
7 - 14 years	2/3 packet
4 - 6 years	1/2 packet
Less than 4 years	Do not use

### <Cautions >

This medication should be given to children only under adult supervision

### INGREDIENTS

3 packets (2.0g/packet) of **Maoto Extract Fine Granules** contain 1.4g of a dried extract of the following mixed crude drugs.

JP Ephedra Herb	.....5.0g
JP Apricot Kernel	.....5.0g
JP Cinnamon Bark	.....4.0g
JP Glycyrrhiza	.....1.5g

Inactive ingredients

JP Lactose Hydrate, JP Corn Starch  
(JP: The Japanese Pharmacopoeia)

### PRECAUTIONS FOR STORAGE AND HANDLING

- (1) Store in a cool, dry place free from direct sunlight.
- (2) Keep all medication out of the reach of children.
- (3) Do not transfer to another container to prevent misuse and quality deterioration.
- (4) When you take this medicine in divided dose, fold over the opened edge of the packet and store it. The remaining medicine should be taken within 2 days.

Sanwa Shoyaku Co., Ltd.

### **CONTACT INFORMATION**

Please ask the drug store you bought this or call the following phone number when you need more information about this drug.

Sanwa Shoyaku Co., Ltd. Consumer Information Service Center  
6-6-1 Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan  
Tel : 03-3834-2171  
(Monday - Friday 10:00 - 17:00 except national holidays)

Since the medicine contains crude drugs, the color may vary for individual products, however this has no influence on the efficacy of this medicine.
--

### **Manufactured and Distributed by:**

Sanwa Shoyaku Co., Ltd.  
6-1 Hiraide-Kogyo-Danchi, Utsunomiya-city, Tochigi, Japan